

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

_____ Д.Л.Пиневиц

04.10.2013

Регистрационный №051-0513

**МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ ДИСПЛАЗИИ
ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА**
Инструкция по применению

Учреждения-разработчики:

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии»

УЗ «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями»

Авторы:

д.м.н., доцент Герасименко М.А., д.м.н., профессор Белецкий А.В.,

Платонов А.В.

Минск, 2013

Настоящая инструкция по применению разработана в целях совершенствования выбора тактики лечения врожденной дисплазии тазобедренных суставов (ВДТБС) у детей первого года жизни.

Применение предлагаемого лечебного алгоритма позволит повысить эффективность лечения и, тем самым улучшить исходы лечения ВДТБС.

Инструкция предназначена для следующих врачей - специалистов: врачей-неонатологов, врачей-травматологов-ортопедов.

Показания к применению алгоритма:

- в родильном доме - новорожденные, у которых установлен диагноз ВДТБС;
- в поликлинике – пациенты, у которых установлен диагноз ВДТБС.

Противопоказания к применению:

- не выявлено.

Перечень необходимых условий и оборудования:

- кабинет, оснащенный пеленальным столом, кушеткой;
- аппарат для ультразвуковых исследований, оснащенный датчиком 7,5 МГц.
- рентгеновский кабинет.

Методика алгоритма (Приложение 1).

Алгоритм лечения врожденной дисплазии тазобедренных суставов у детей грудного возраста

| Тактика лечения при ВДТБС подтвержденной УЗИ ТБС в случае выявления патологии в родильном доме | | | Тактика лечения при ВДТБС подтвержденной УЗИ ТБС* в случае выявления патологии в возрасте от 1-го месяца до 1-го года жизни | | | |
|---|--|--|---|---|--|---|
| Предвывих бедра (по Graf тип II подтип А, замедленная оссификация) | Предвывих бедра (по Graf тип II подтип С) | Подвывих и вывих бедра (по Graf тип III подтип А,Б; тип IV) | Предвывих бедра | | Предвывих бедра (по Graf тип II подтип С) | Подвывих и вывих бедра (по Graf тип III подтип А,Б; тип IV) |
| | | | (по Graf тип II подтип А, замедленная оссификация) | (по Graf тип II подтип Б, замедленная оссификация)) | | |
| ↓ пассивная ЛФК, начиная с 3-х недельного возраста ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС, при формировании сустава до типа I подтипы А, Б ↓ массаж общий укрепляющий, пассивная ЛФК | ↓ широкое пеленание – 30 дней, затем лечение в абдукционной конструкции ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС и продолжение лечения, при формировании сустава до типа II подтипы А, Б ↓ отмена | ↓ широкое пеленание – 30 дней, затем лечение в абдукционной конструкции ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС и продолжение лечения, при формировании сустава до типа II подтипы А, Б ↓ отмена | ↓ пассивная ЛФК ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС, при формировании сустава до типа I подтипы А, Б ↓ массаж общий укрепляющий, пассивная ЛФК ↓ лечение завершается | ↓ пассивная ЛФК, начиная с 3-х месячного возраста периодически курсы общего укрепляющего массажа ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС при формировании сустава до типа I подтипов А,Б | ↓ лечение в абдукционной конструкции ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС* и продолжение лечения, при формировании сустава до типа II подтипы А, Б ↓ отмена лечения в абдукционной конструкции, | ↓ в случае выявления вывиха показана рентгенография таза в прямой проекции ↓ лечение в абдукционной конструкции ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС *и продолжение лечения, при формировании |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">↓ лечение завершается ↓ наблюдение ортопеда</p> | <p style="text-align: center;">лечения в абдукционной конструкции, массаж общий укрепляющий, пассивная ЛФК ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС и продолжение лечения, при формировании сустава до типа I подтипы А, Б ↓ массаж общий укрепляющий, пассивная ЛФК ↓ лечение завершается ↓ наблюдение ортопеда</p> | <p style="text-align: center;">лечения в абдукционной конструкции, массаж общий укрепляющий, пассивная ЛФК ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС и продолжение лечения, при формировании сустава до типа I подтипы А, Б ↓ массаж общий укрепляющий, пассивная ЛФК ↓ лечение завершается ↓ наблюдение ортопеда</p> | <p style="text-align: center;">↓ наблюдение ортопеда</p> | <p style="text-align: center;">↓ лечение завершается ↓ наблюдение ортопеда</p> | <p style="text-align: center;">массаж общий укрепляющий, пассивная ЛФК ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС* и продолжение лечения, при формировании сустава до типа I, подтипы А, Б ↓ лечение завершается ↓ наблюдение ортопеда</p> | <p style="text-align: center;">сустава до типа II подтипы А, Б ↓ отмена лечения в абдукционной конструкции, массаж общий укрепляющий, пассивная ЛФК ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС* и продолжение лечения, при формировании сустава до типа I, подтипы А, Б ↓ массаж общий укрепляющий, пассивная ЛФК ↓ лечение завершается ↓ наблюдение ортопеда</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

* Пациентам в возрасте старше 6-ти месяцев проводится рентгенография таза в прямой проекции

