

ЛекФарм®

Кардиологические препараты СООО «Лекфарм»



Кузьмина Елена Викторовна
Ведущий специалист отдела маркетинга
Минск
22 марта 2017 года

Качественные препараты по доступным ценам

Сердечно-сосудистые заболевания - ведущая причина смертности в РБ



Ежегодно в мире **17 миллионов** человек умирает от сердечно-сосудистых заболеваний

52,1% смертей в Беларуси - смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

СООО «Лекфарм» - лидер в производстве препаратов для лечения и профилактики ССЗ

- ① **2017** год – СООО «Лекфарм» входит в **ТОП 3** корпораций на рынке РБ
- ① **2016** год – **№1** в группе препаратов для лечения заболеваний ССС (группа С по классификации АТС) с долей **25 %**
- ① **2016** год – **№1** в группе препаратов, влияющих на РААС (группа С09: иАПФ+сартаны) с долей **25,3 %**
- ① **2016** год – вышли на **№1** в группе комбинированных иАПФ (группа С09В) с долей **22 %**



2007

2 МНН
Эналаприл,
Амлодипин



2017

23 МНН

Кардиологические препараты СООО



Ингибиторы АПФ



Бета-адреноблокаторы



Статины



Агонисты имидазолин. рецепторов



БКК



Метаболические препараты



Диуретики




Ингибиторы АПФ: монопрепараты

НОВИНКА!



ИНДАЛОНГ



МНН: Indapamide

Форма выпуска: таблетки
продолжительного действия

Фармакотерапевтическая группа:
Нетиазидный диуретик, действующий на
кортикальный сегмент петли Генле

Дозировка: индапамид **1,5 мг** №30

Отпуск из аптек без рецепта



***Единственный** диуретик
отечественного производства
с модифицированным высвобождением*



ИНДАЛОНГ



Единственное, но жизненно важное показание - артериальная гипертензия

- **Пролонгированная форма** высвобождения основана на неактивном ингредиенте, **гидрофильном матриксе**, который запускает замедленное высвобождение активной субстанции
- **постоянная** эффективная **концентрация** препарата в крови на протяжении суток
- **стабильный** антигипертензивный **эффект** при приеме 1 таблетки индапамида 1,5 мг Индалонг
- Индалонг принимают по 1 таблетке 1,5 мг в день независимо от приема пищи

Индалонг – минимальная дозировка индапамида для максимального эффекта




■ обычное высвобождение, 2.5 мг
■ замедленное высвобождение, 1.5 мг

ИНДАЛОНГ




3 из 4-х пациентов с АГ нуждаются в комбинированной терапии



Основные клинические исследования показали, что для достижения
целевого АД необходимо в среднем **2** антигипертензивных препарата

1. Sica DA. Rationale for fixed-dose combinations in the treatment of hypertension. The cycle repeats. *Drugs* 2002; 62: 443–62. 2. Bakris GL et al. The importance of blood pressure control in the patient with diabetes. *Am J Med* 2004; 116(5A): 30S–8S. 3. Dahlöf B et al. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial. *Lancet* 2005; 366: 895–906. 4. Jamerson K et al. Benazepril plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hypertension in high-risk patients. *N Engl J Med* 2008; 359: 2417–28. 5. Gradman AH, Basile JN, Carter BL et al. *J Am Soc Hypertens*. 2010; 4(1): 42–50.

В чём рациональность комбинации двух препаратов?



- ⌚ **Выше эффективность** за счет *разных, но взаимодополняющих* механизмов действия препаратов из разных классов
- ⌚ **Лучшая защита** органов-мишеней помимо снижения АД
- ⌚ **Лучше переносимость** - Меньше вероятность побочных эффектов за счет снижения дозировок и взаимного нивелирования побочных эффектов
- ⌚ Комбинированные препараты обычно принимают один раз в день – **лучшая приверженность** лечению
- ⌚ Реже визиты к врачу
- ⌚ Возможность уменьшить стоимость лечения



Материал подготовлен

Европейские рекомендации рекомендуют использовать фиксированные комбинации



для **УПРОЩЕНИЯ**
терапии!



EUROPEAN
SOCIETY OF
CARDIOLOGY



Руководство по АГ ESH/ESC 2013

подтверждает, что: комбинация иАПФ/БКК и иАПФ/диуретик являются предпочтительными для антигипертензивной терапии



- иАПФ, БРА, Диуретики, АКК, ББ подходят для начала лечения и поддерживающей терапии как самостоятельно, так и в некоторых комбинациях-**IA**.
- Некоторые агенты нужно рассматривать в качестве первостепенного выбора при особых состояниях (в связи с их использованием в исследованиях этих состояний или из-за большей эффективности при определенных типах ПО)-**IIaC**

ООО «Лекфарм» - *лидер* отечественной
фармпромышленности по производству
фиксированных комбинаций блокаторов РААС
(3 МНН)



НОВИНКА!



НОВИНКА!

РАМИЛОНГ ПЛЮС

МНН: Ramipril, Hydrochlorothiazide

Форма выпуска: таблетки №30

Фармакотерапевтическая группа:

Ингибиторы АПФ и диуретики

Дозировка:

Рамиприл **2,5** мг + ГХТЗ **12,5** мг

Рамиприл **5** мг+ ГХТЗ **25** мг

Рамиприл **10** мг + ГХТЗ **12,5** мг

Рамиприл **10** мг + ГХТЗ **25** мг

Входит в ПОЛС и РФ

*Единственная отечественная
комбинация рамиприла
с гидрохлортиазидом*

*Единственный рамиприл в РБ
с 4-мя комбинациями
с гидрохлортиазидом*



ЛЕКОАРМ®

Рамиприл один из самых изученных и АПФ - надежность эффективной терапии с Рамилонг/Рамилонг плюс

Артериальная гипертензия

Burris, CARE, RACE (atenolol), Koenig (lisinopril), Nami (lisinopril, quinapril, enalapril)

Острый ИМ с дисфункцией ЛЖ

AIRE/AIREX

ИБС после инвазивной реваскуляризации

APRES



Инсульт

SECURE

Диабетическая нефропатия I типа

Lewis-II, MICRO-HOPE

Хроническая недиабетическая нефропатия

REIN (Gisen)

ИБС

HOPE, HOPE-TOO

Широкая линейка Рамилонг/ Рамилонг плюс (7 различных дозировок и 4 комбинации с ГХТЗ) – удобство титрации, индивидуализация терапии

ЭКВАПРИЛ

Когда комбинированная терапия необходима

МНН: Amlodipine, Lisinopril

Фармакотерапевтическая группа:

БКК в комбинации с иАПФ

Форма выпуска: таблетки №30

Дозировка:

Амлодипин **5** мг

Лизиноприл **10** мг



- ⌚ Двойная эффективность (АГ+ИБС) благодаря взаимодополняющему механизму действия амлодипина и лизиноприла
- ⌚ Улучшенная переносимость – **меньше** периферических **отеков**
- ⌚ Простая схема лечения - **1** комбинированная таблетка **1** раз в день - выше приверженность пациентов терапии
- ⌚ Качество стандарта GMP
- ⌚ Доступная стоимость современной терапии
- ⌚ **Отпускается без рецепта**
- ⌚ Входит в ПОЛС и РФ



АМЛОТЕНЗИН



МНН: Perindopril/Amlodipine

Периндоприл трет-бутиламин/амлодипин (бесилат)

Фармакотерапевтическая группа:

Ингибиторы АПФ и БКК

Форма выпуска:

капсулы

Дозировка:

Периндоприл+амлодипин

4 мг/5 мг капсулы N30

4 мг/10 мг капсулы N30

8 мг/5 мг капсулы N30

8 мг/10 мг капсулы N30

Входит в ПОЛС



НОВИНКА!

*Единственная отечественная
комбинация
периндоприла и амлодипина*

Отпуск из аптек: по рецепту врача

РУ 16/10/2243 от 31.07.2014 до 31.07.2019г.

лекoарм®

Показания к применению Амлотензина



- Амлотензин показан для лечения эссенциальной гипертензии и/или стабильной болезни коронарных артерий, требующих лечения периндоприлом и амлодипином.



для




и/или



Комбинация периндоприла с амлодипином эффективно снижает АД ...




... у пациентов, которые не смогли достичь целевого АД на терапии другими препаратами



иАПФ – ингибитор ангиотензин-превращающего фермента

2. Bahl VK, Jadhav UM, Thacker HP et al. Blood pressure control of fixed dose perindopril/amlodipine combination treatment in hypertensive patients uncontrolled on monotherapy or on two drug combination therapy. J Hypertens. 2010; 28; e98.

Комбинация периндоприла с амлодипином снижает все случаи важных сердечно-сосудистых событий и общую смертность у пациентов с АГ, АГ и высоким СС риском




n = 19 257
vs atenolol + thiazide

Anglo-Scandinavian
ascot
Cardiac Outcomes Trial


Эффективная и хорошо переносимая терапия для снижения высокого АД



- Комбинация периндоприла и амлодипина имеет комплементарный механизм действия, что приводит к снижению побочных эффектов амлодипина



Расширение вен и артерий



Снижает вероятность отёка лодыжек

1. Bahl VK, Jadhav UM and Thacker HP. Management of hypertension with the fixed combination of perindopril and amlodipine in daily clinical practice: results from the STRONG prospective, observational, multicenter study. Am J Cardiovasc Drugs. 2009; 9: 135–42. 2. Bahl VK, Jadhav UM, Thacker HP et al. Blood pressure control of fixed dose perindopril/amlodipine combination treatment in hypertensive patients uncontrolled on monotherapy or on two drug combination therapy. J Hypertens. 2010; 28; e98. 3. Ferrari R. Optimizing the treatment of hypertension and stable coronary artery disease: clinical evidence for fixed-combination perindopril/amlodipine. Curr Med Res Opin. 2008; 24: 3543–57.

Клиническая эффективность и безопасность Амлотензина сопоставимы с оригинальным препаратом



ОТЧЕТ

о проведении сравнительного рандомизированного открытого контролируемого клинического испытания эффективности и безопасности лекарственного средства **АМЛОТЕНЗИН**, производства ООО «ЛЕКФАРМ», Республика Беларусь, в сравнении с лекарственным средством **ПРЕСТАНС**, производства SERVIER IRELAND INDUSTRIES LTD., Ирландия, применяемого у пациентов с артериальной гипертензией

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология»

Проведенное исследование свидетельствует о том, что лекарственное средство **Амлотензин**, производства **ООО «Лекфарм»**, Республика Беларусь и лекарственное средство Престанс, производства Servier (Ireland) Industries LTD., Ирландия обладают сопоставимым выраженным антигипертензивным действием.

- При сравнительном анализе эффективности **Амлотензина** и Престанса у пациентов с артериальной гипертензией не обнаружено статистически значимых различий по уровню снижения офисного артериального давления, данным суточного мониторирования артериального давления, частоте гипертонических кризов к концу фармакотерапии. Процент пациентов, достигших целевого уровня АД, составил 100% в обеих группах.

- По данным проведенного исследования безопасность лекарственного средства **Амлотензин** и лекарственного средства Престанс сопоставима.

Амлотензин предлагает УДОБНУЮ терапию по доступной цене



- 1 капсула в день
- 2 препарата в 1 капсуле
- 4 дозировки в удобной для пациента упаковке



С Амлотензином цели достижимы

ЛИПРОМАК-ЛФ

Липромак-ЛФ – аторвастатин с доказанной клинической эффективностью

МНН: Atorvastatin

Фармакотерапевтическая группа:

Гиполипидемические средства, статины, ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы

Форма выпуска: таблетки п/о

Дозировка:

10 мг, 20 мг, 40 мг №30 и №60

- ⓪ Эффективно снижает уровень холестерина ЛПНП, триглицеридов
- ⓪ Замедляет прогрессирование атеросклероза
- ⓪ Доказано снижает риск развития ССЗ и ССС
- ⓪ Безопасная гиполипидемическая терапия в высоких дозах (80 мг)
- ⓪ Пожилые пациенты и пациенты с почечной недостаточностью не нуждаются в корректировке дозы
- ⓪ Биоэквивалентен оригинатору
- ⓪ Наиболее доступный аторвастатин в дозе 40 мг



Метаболические цитопротекторные препараты



МНН: Trimetazidine

Фармакотерапевтическая группа: Прочие средства для лечения заболеваний сердца

Форма выпуска: таблетки модифицированного высвобождения

Дозировка: 35 мг №60

Отпускается без рецепта



МНН: Meldonium

Фармакотерапевтическая группа: Прочие средства для лечения заболеваний сердца

Форма выпуска: Раствор для в/венного и в/мышечного введения

Дозировка: 500 мг / 5 мл № 10

Отпускается без рецепта

*Мельдонат – миокард будет рад
Три-зидин М – ишемию победим*

МЕЛЬДОНАТ



Мельдонат - универсальный цитопротектор отечественного производства для комплексной терапии сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний

- ① **Универсальный цитопротектор** - Мельдонат эффективен при ишемических повреждениях любой локализации, **защищает клетки от гибели, сохраняя их структурную и функциональную целостность**
- ① **Двойной механизм** действия (цитопротекторный и сосудистый), обеспечивающий улучшенную эффективность
- ① **Сохранение** цитопротективного и антиишемического **эффекта** Мельдоната после курса терапии
- ① **Безопасность терапии** - пожилые пациенты не нуждаются в специальной дозе



НОВИНКА!

Способ применения и дозы Мельдоната

- Взрослым вся суточная доза **0,5-1,0 г** вводится сразу или разделяется на два приема
- Максимальная суточная доза 1,0 г – 2 ампулы по 5 мл
- Рекомендуется применять Мельдонат в первую половину дня
- **Для пожилых пациентов специальные рекомендации отсутствуют**



Способ введения	Суточная Доза	Кратность	Длительность лечения
внутривенно	500-1 000 мг 1-2 ампулы по 5 мл	1-2 раза в день	Определяется врачом



Мельдонат – миокард будет рад

Три-зидин М – ишемию победим

Кардиологические препараты СООО «Лекфарм» и ограничительные перечни

ЛС		Перечень ОЛС (Приложение к Постановлению МЗ РБ 16.07.2007 № 65 , в редакции Постановления МЗ РБ №25 от 4.04 2014г)	Республиканский Формуляр Постановление МЗ РБ от 01.07.2016 №80	Перечень ЛС, реализуемых без рецепта врача (Приложение к Постановлению МЗ РБ №55 от 05.06.2012г)
Эквалприл (амлодипин/лизиноприл) таблетки 5/10мг №30		Включен (Примечание Пункт 2*; комбинир ЛС) амлодипин (стр 18; С08 БКК)/лизиноприл (стр 19; С09А иАПФ)	Включен (стр 55)	без рецепта
Амлотензин (периндоприл/амлодипин) капсулы №30 4/5; 4/10; 8/5; 8/10 мг		Включен (Примечание Пункт 2*; комбинир ЛС) периндоприл (стр 19; С09А иАПФ)/амлодипин (стр 18; С08 БКК)	Не включен	по рецепту
Рамилонг плюс (рамиприл/ГХТЗ) таблетки №30 2,5/12,5; 5/25; 10/12,5; 10/25мг		Включен (Примечание Пункт 2*; комбинир ЛС) периндоприл (стр 19; С09А иАПФ)/ГХТЗ (стр 15; С03А Мочегонные с низким потолком дозы, тиазиды)	Включен (стр 55)	по рецепту
Липромак-ЛФ (аторвастатин) таблетки 10мг №30, 60; 20мг №30, 60; 40мг №30		Включен (стр 19; С10А ГипоХС и гипоТГемические ср-ва)	Включен (стр 56)	по рецепту
Индалонг (индапамид МВ) таблетки 1,5мг №30		Включен (стр 16; С03В Мочегонные с низким потолком дозы, исключая тиазиды)	Включен (стр 46)	без рецепта

Перечень ОЛС



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«4» апреля 2014 г. № 25

г. Минск

О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65

г. Минск

«Приложение к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.07.2007 № 65 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 04.04.2014 № 25)»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных лекарственных средств

Примечания:


1. Название лекарственного средства упоминается в настоящем перечне основных лекарственных средств один раз во всех лекарственных формах и располагается в наиболее значимой фармакотерапевтической группе.

2. К основным лекарственным средствам относятся также комбинированные лекарственные средства (готовые и аптечного изготовления), состоящие из лекарственных средств, включенных в настоящий перечень основных лекарственных средств.»

Министр

В.И.Жарко

главные новости



Лек^oарм[®]



Качество доступно



Лек^oарм[®]



Спасибо за внимание

Качественные препараты по доступным ценам