

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель Министра

_____ Д.Л. Пиневиц

«_____» _____ 20__ г.

Регистрационный №045-0413

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОПИСТОРХОЗА

Инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов
медицинский университет».

АВТОРЫ: д.м.н., проф. В.Я. Бекиш;
д.м.н., проф. В.М.Семенов;
к.м.н., доц. Л.Э. Бекиш;
к.б.н., доц. В.В. Зорина;
Д.К. Кужель.

Минск 2013

Настоящая инструкция по применению (далее – инструкция) позволяет повысить клиническую эффективность терапии пациентов с описторхозом в зависимости от возраста, избежать побочных осложнений при лечении только одним празиквантелом и защитить геном человека от повреждений метаболитами кошачьих сосальщиков.

Инструкция предназначена для врачей-инфекционистов, других врачей-специалистов, оказывающих медицинскую помощь пациентам с описторхозом.

Перечень лекарственных средств

1. Празиквантель в таблетках по 600 мг.
2. Ибупрофен в таблетках по 200 мг. или в 2 % суспензии.
3. Витаминный комплекс с селеном (Vit. С – 100 мг, Vit. Е – 30 мг, β -каротин – 6 мг, Se – 0,03 мг) или эти витамины и Se отдельно в таких же дозировках.

Показания к применению

Показанием к назначению комбинированной терапии описторхоза является четкое установление диагноза заболевания на основании обнаружения в фекалиях и дуоденальном содержимом пациента яиц кошачьего сосальщика, диспепсических расстройств (снижение аппетита, тошнота, отрыжка, изжога, рвота, боли и вздутия в животе, поносы или их чередование с запорами), клинической симптоматики (повышенная утомляемость, беспокойный сон, боли в эпигастральной области, правом подреберье, гепатомегалия), общего анализа крови (лейкоцитоз, эозинофилия, увеличение СОЭ), биохимического анализа крови (повышение активности трансаминаз – АЛТ и АСТ, щелочной фосфатазы, увеличение прямого билирубина), эпидемиологического анамнеза (упот-

ребление в пищу рыбы семейства карповые), а также проведения иммуноферментного анализа с описторхозным антигеном (1:800 и выше).

Противопоказания к применению

При проведении терапии описторхоза необходимо учитывать индивидуальную чувствительность пациентов к празиквантелю, ибупрофену. Противопоказаниями являются: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; нарушения со стороны системы кроветворения (тромбоцитопения, агранулоцитоз); непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов; беременность в связи с возможным тератогенным действием празиквантеля. Другие противопоказания к применению комбинированного метода лечения описторхоза отсутствуют.

Технология использования метода

Лечение описторхоза проводится по схеме в зависимости от возраста пациента:

Препарат	Дозировка препарата	Время приема	Длительность курса
Празиквантель в табл. по 600 мг.	70 мг/кг в сутки в три приема	Внутри после еды	1 день
Ибупрофен в табл. по 200 мг	<i>Для возраста 8-12 лет – ½ таблетки 4 раза в день. Для возраста старше 12 лет – 1 таблетка 4 раза в день.</i>	Внутри после еды	3 дня
Витаминный комплекс с селеном	<i>Для возраста 3-15 лет – Vit. С – 50 мг, Vit. Е – 12,5 мг, β-каротин – 1,5 мг, Se – 0,015 мг. Для возраста старше 15 лет – Vit. С – 100 мг, Vit. Е – 30 мг, β-каротин – 6 мг, Se – 0,03 мг</i>	Внутри после еды	3 дня

Перечень возможных осложнений или ошибок при выполнении и пути их устранения

Ошибки могут возникнуть вследствие несоблюдения схемы лечения описторхоза. Низкая эффективность предложенного способа лечения может быть обусловлена заменой празиквантела его аналогами, не прошедшими клинического испытания в Республике, а также другими противопаразитарными лекарственными средствами, изменением длительности приема суточной дозы празиквантела, несоблюдения доз ибупрофена и витаминов с селеном.