

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ

17 декабря 2007 г. № 171

**Об утверждении единых норм и нормативов  
материальных и трудовых затрат (времени, расхода  
основных и вспомогательных материалов) на платные  
медицинские услуги по проктологии, оказываемые  
юридическими лицами всех форм собственности и  
индивидуальными предпринимателями в  
установленном порядке**

На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

единые нормы и нормативы трудовых затрат (времени) на платные медицинские услуги по проктологии, оказываемые юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями в установленном порядке, согласно приложению 1;

единые нормы и нормативы материальных затрат (расхода основных и вспомогательных материалов) на платные медицинские услуги по проктологии, оказываемые юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями в установленном порядке, согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 г.

**Министр**

**В.И.Жарко**

**Единые нормы и нормативы трудовых затрат (времени) на платные медицинские услуги по проктологии, оказываемые юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями в установленном порядке**

| № п/п  | Наименование платной медицинской услуги                                   | Единица измерения | Характеристика работ   | Специалисты, оказывающие платную медицинскую услугу | Норма времени (мин.) |
|--|---|-------------------|--|---|----------------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4  | 5   | 6                    |
| 1. Прием больных с проктологической патологией |   |                   |  |   |                      |
| 1.1.   | Первичный прием врача-проктолога  | Прием             | Регистрация пациента. Беседа с пациентом. Изучение представленной документации. Осмотр пациента. Пальцевое обследование прямой кишки. Назначение дополнительного обследования и лечения. Оформление медицинской документации | Врач-проктолог<br>Медицинская сестра                | 25<br>10             |
| 1.2.   | Повторный прием врача-проктолога  | Прием             | Регистрация пациента. Беседа с пациентом. Изучение результатов обследования. Осмотр пациента. Пальцевое обследование прямой кишки. Коррекция назначенного обследования и лечения. Оформление медицинской документации        | Врач-проктолог<br>Медицинская сестра                | 20<br>10             |
| 2. Проктологические манипуляции                |   |                   |  |   |                      |
| 2.1.   | Аноскопия   | Исследование      | Продолжение предыдущего обследования путем визуального осмотра анального канала через тубус введенного в него стерильного прибора (аноскопа)   | Врач-проктолог<br>Медицинская сестра                | 10<br>5              |
| 2.2.   | Локальная диагностика с помощью зонда и красителей                        | Исследование      | Выполняется как продолжение обследования у больных со свищами прямой кишки путем введения пуговчатого зонда в наружное свищевое отверстие, а затем – красителя для определения сложности свища (хронического парапроктита)   | Врач-проктолог<br>Медицинская сестра                | 20<br>10             |
| 2.3.   | Забор материала из прямой кишки для биопсии и цитологических исследований | Манипуляция       | После обработки рук и одевания на них стерильных перчаток через ано- или ректоскоп стерильными щипцами для биопсии берется необходимый участок стенки прямой кишки   | Врач-проктолог<br>Медицинская сестра                | 20<br>20             |
| 3. Проктологические операции                   |   |                   |  |   |                      |
| 3.1.   | Операция на анальном канале   | Операция          | Все операции на анальном канале выполняют в стерильных   | Врач-проктолог                                      | 40                   |

|       |   |          |  |  |                |
|-------|---|----------|--|--|----------------|
|       |   |          | условиях в операционной. После обработки кожи промежности и ануса ректальным зеркалом производится девульсия ануса в положении больного, как на гинекологическом кресле. Затем выполняют оперативный прием согласно диагнозу, убеждаются в наличии гемостаза и проходимости анального канала, в последний вводят марлевый тампон, на промежность – пращевидная повязка | Медицинская сестра   | 40             |
| 3.2.  | Инфракрасная коагуляция при геморрое 1–2-й стадии   | Операция | После обработки кожи промежности вводится ректальное зеркало. Инфракрасным излучением над внутренним геморроидальным узлом за счет теплового (коагуляционного) эффекта прекращается доступ крови к узлу из подслизистых артерий  | Врач-проктолог<br>Медицинская сестра   | 40<br>40       |
| 3.3.  | Полипэктомии через ректоскоп или аноскоп  | Операция | После обработки кожи промежности вводится ректальное зеркало. Данная операция выполняется аналогично забору материала из прямой кишки для биопсии (подпункт 2.3)   | Врач-проктолог<br>Медицинская сестра   | 40<br>40       |
| 3.4.  | Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами   | Операция | После обработки кожи промежности вводится ректальное зеркало. Во время аноскопии при помощи лигатора производится пережатие латексным кольцом основания геморроидального узла, которое за 6–8 дней некротизируется и узел отпадает   | Врач-проктолог<br>Медицинская сестра   | 40<br>40       |
| 3.5.  | Склеротерапия геморроидальных узлов   | Операция | После обработки кожи промежности вводится ректальное зеркало. В стерильных условиях в узел вводится нужное количество склерозанта  | Врач-проктолог<br>Медицинская сестра   | 40<br>40       |
| 3.6.  | Лечение хронических анальных трещин без операции (типа Рекамье)   | Операция | После обработки кожи промежности вводится ректальное зеркало. Анальным зеркалом при девульсии надрываются волокна анального жома, ликвидируется сфинктероспазм, после чего трещина заживает  | Врач-проктолог   | 30             |
| 3.7.  | Иссечение современными техническими средствами анальных бахромок, или анальных трещин, или папиллом, или фибром, или кондилом | Операция | После обработки кожи промежности вводится ректальное зеркало. Образование анального канала оттягивается от его стенки инструментом, отжигается по основанию современным электро-, радио- или лазерохирургическим аппаратом   | Врач-проктолог<br>Медицинская сестра   | 20<br>20       |
| 3.8.  | Геморроидэктомия с использованием аппарата Лигашу, или ультразвукового скальпеля, или сургитрона, или лазера                  | Операция | После обработки кожи промежности вводится ректальное зеркало. Оттянутый зажимами Аллиса геморроидальный узел за один ход бранши аппарата или поэтапно отжигается по основанию продольно оси кишки  | Врач-проктолог<br>Медицинская сестра   | 40<br>40       |
| 3.9.  | Вскрытие абсцедирующего эпителиального копчикового хода   | Операция | После обработки кожи промежности разрезом в межъягодичной складке вскрывают абсцесс, иссекают некротические ткани и дренируют полость  | Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Медицинская сестра | 40<br>40<br>40 |
| 3.10. | Дермоидоз промежности   | Операция | После обработки кожи промежности разрезами в зависимости   | Врач-проктолог (врач-  | 60             |

|       |   |   |   |  |                   |
|-------|---|---|---|--|-------------------|
|       |   | от протяженности дермоидоза поэтапно иссекают внутрикожные и подкожные гнойные ходы | хирург)<br>Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Медицинская сестра   | 60<br>60   |                   |
| 3.11. | Иссечение параректальных кист                                 | Операция  | После обработки кожи промежности параректальным разрезом под пальцевым контролем стенки прямой кишки тупо и остро удаляют кисту, рану послойно ушивают  | Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Медицинская сестра | 40<br>40<br>40    |
| 3.12. | Иссечение пресакральных кист                                  | Операция  | Продольным парасакральным разрезом рассекают мягкие ткани, по показаниям удаляют копчик и поэтапно выделяют и удаляют кисту, полость тампонируют, рану ушивают до тампонов  | Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Медицинская сестра | 120<br>120<br>120 |
| 3.13. | Иссечение анальной трещины                                    | Операция  | После обработки кожи промежности вводится ректальное зеркало. Иссекают окаймляющими разрезами трещину и рубцовые ткани, по показаниям выполняют сфинктеротомию, рану частично ушивают продольно или наглухо поперечно           | Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Медицинская сестра | 30<br>30<br>30    |
| 3.14. | Традиционное иссечение анального полипа или бахромок          | Операция  | После обработки кожи промежности вводится ректальное зеркало. Иссекается патологическое образование, рану ушивают рассасывающимся шовным материалом   | Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Медицинская сестра | 30<br>30<br>30    |
| 3.15. | Геморроидэктомия с восстановлением слизистой анального канала | Операция  | После обработки кожи промежности вводится ректальное зеркало. После обработки кожи промежности на 3, 7 и 11-м часах поочередно иссекают геморроидальные узлы с прошиванием сосудистой ножки и ушиванием ран                     | Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Медицинская сестра | 45<br>45<br>45    |
| 3.16. | Иссечение эпителиального копчикового хода                     | Операция  | После обработки кожи промежности окаймляющими разрезами иссекают эпителиально-копчиковый ход и затеки, затем края раны ушивают наглухо или подшивают их к дну раны или выполняют пластику перемещенным кожно-подкожным лоскутом | Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Медицинская сестра | 60<br>60<br>90    |
| 3.17. | Традиционное иссечение перианальных кандилом                  | Операция  | После обработки кожи промежности поочередно скальпелем или электрокоагулятором иссекают кандиломы, кровоточащие кожные раны ушивают   | Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Врач-проктолог (врач-хирург)<br>Медицинская сестра | 30<br>30<br>30    |

**Единые нормы и нормативы материальных затрат (расхода основных и вспомогательных материалов) на платные медицинские услуги по проктологии, оказываемые юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями в установленном порядке**

| № п/п  | Наименование услуги   | Наименование используемых материалов | Единица измерения | Норма расхода материалов |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1  | 2   | 3                                    | 4                 | 5                        |
| 1. Прием больных с проктологической патологией |   |                                      |                   |                          |
| 1.1.   | Первичный прием врача-проктолога  | Перчатки                             | пара              | 1                        |
|  |   | Мыло жидкое                          | г                 | 2                        |
|  |   | Дезсредство                          | мл                | 4                        |
|  |   | Антисептик для рук                   | мл                | 3                        |
| 1.2.   | Повторный прием врача-проктолога  | Перчатки                             | пара              | 1                        |
|  |   | Мыло жидкое                          | г                 | 2                        |
|  |   | Дезсредство                          | мл                | 4                        |
|  |   | Антисептик для рук                   | мл                | 3                        |
| 2. Проктологические манипуляции                |   |                                      |                   |                          |
| 2.1.   | Аноскопия   | Перчатки                             | пара              | 1                        |
|  |   | Мыло жидкое                          | г                 | 2                        |
|  |   | Дезсредство                          | мл                | 4                        |
|  |   | Антисептик для рук                   | мл                | 3                        |
| 2.2.   | Локальная диагностика с помощью зонда и красителей                        | Перчатки                             | пара              | 1                        |
|  |   | Мыло жидкое                          | г                 | 2                        |
|  |   | Дезсредство                          | м                 | 4                        |
|  |   | Антисептик для рук                   | мл                | 3                        |
|  |   | Салфетки хирургические средние       | шт.               | 5                        |
|  |   | Бриллиантовый зеленый                | мл                | 10                       |
|  |   | Шприц                                | шт.               | 1                        |
| 2.3.   | Забор материала из прямой кишки для биопсии и цитологических исследований | Перчатки                             | пара              | 1                        |
|  |   | Мыло жидкое                          | г                 | 2                        |
|  |   | Дезсредство                          | м                 | 4                        |
|  |   | Антисептик для рук                   | мл                | 3                        |
|  |   | Салфетки хирургические средние       | шт.               | 5                        |
|  |   | Бриллиантовый зеленый                | мл                | 10                       |
|  |   | Шприц                                | шт.               | 1                        |
| 3. Проктологические операции                   |   |                                      |                   |                          |

|   |  |          |      |
|---|--|----------|------|
| 3.1. Операции на анальном канале              | Перчатки   | пара     | 1    |
|   | Мыло жидкое  | г        | 2    |
|   | Дезсредство  | мл       | 4    |
|   | Антисептик для рук   | мл       | 3    |
|   | Комплект белья хирургический                               | шт.      | 1    |
|   | Комплект одноразовый (шапочка, бахилы, маска)              | шт.      | 2    |
|   | Местный анестетик  | амп.     | 4    |
|   | Лейкопластырь  | см       | 30   |
|   | Шприц 5 мл   | шт.      | 2    |
|   | Нить хирургическая викрил                                  | шт.      | 3    |
|   | Салфетки хирургические средние                             | шт.      | 20   |
|   | Мазь «Левомиколь»  | г        | 10   |
|   | 3.2. Инфракрасная коагуляция при геморрое 1–2-й стадии     | Перчатки | пара |
| Мыло жидкое                                   |  | г        | 2    |
| Дезсредство                                   |  | мл       | 4    |
| Антисептик для рук                            |  | мл       | 3    |
| Комплект белья хирургический                  |  | шт.      | 1    |
| Комплект одноразовый (шапочка, бахилы, маска) |  | шт.      | 2    |
| Местный анестетик                             |  | амп.     | 4    |
| Лейкопластырь                                 |  | см       | 30   |
| Шприц 5 мл                                    |  | шт.      | 2    |
| Нить хирургическая викрил                     |  | шт.      | 3    |
| Салфетки хирургические средние                |  | шт.      | 20   |
| Мазь «Левомиколь»                             |  | г        | 10   |
| 3.3. Полипэктомии через ректоскоп или аноскоп |  | Перчатки | пара |
|   | Мыло жидкое  | г        | 2    |
|   | Дезсредство  | мл       | 4    |
|   | Антисептик для рук   | мл       | 3    |
|   | Комплект белья хирургический                               | шт.      | 1    |
|   | Комплект одноразовый (шапочка, бахилы, маска)              | шт.      | 2    |
|   | Местный анестетик  | амп.     | 4    |
|   | Лейкопластырь  | см       | 30   |
|   | Шприц 5 мл   | шт.      | 2    |
|   | Нить хирургическая викрил                                  | шт.      | 3    |
|   | Салфетки хирургические средние                             | шт.      | 20   |
|   | Мазь «Левомиколь»  | г        | 10   |
|   | 3.4. Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами | Перчатки | пара |
| Мыло жидкое                                   |  | г        | 2    |
| Дезсредство                                   |  | мл       | 4    |

|  |   |      |    |
|--|---|------|----|
|  | Антисептик для рук                            | мл   | 3  |
|  | Комплект белья хирургический                  | шт.  | 1  |
|  | Комплект одноразовый (шапочка, бахилы, маска) | шт.  | 2  |
|  | Местный анестетик                             | амп. | 4  |
|  | Лейкопластырь                                 | см   | 30 |
|  | Шприц 5 мл                                    | шт.  | 2  |
|  | Нить хирургическая викрил                     | шт.  | 3  |
|  | Салфетки хирургические средние                | шт.  | 20 |
|  | Мазь «Левомиколь»                             | г    | 10 |
|  | Латексные кольца                              | шт.  | 3  |
| 3.5. Склеротерапия геморроидальных узлов   | Перчатки                                      | пара | 1  |
|  | Мыло жидкое                                   | г    | 2  |
|  | Дезсредство                                   | мл   | 4  |
|  | Антисептик для рук                            | мл   | 3  |
|  | Комплект белья хирургический                  | шт.  | 1  |
|  | Комплект одноразовый (шапочка, бахилы, маска) | шт.  | 2  |
|  | Склерозант (этоксисклерол)                    | амп. | 2  |
|  | Лейкопластырь                                 | см   | 30 |
|  | Шприц 5 мл                                    | шт.  | 2  |
| 3.6. Лечение хронических анальных трещин без операции (типа Рекамье)   | Перчатки                                      | пара | 1  |
|  | Мыло жидкое                                   | г    | 2  |
|  | Дезсредство                                   | мл   | 4  |
|  | Антисептик для рук                            | мл   | 3  |
|  | Комплект белья хирургический                  | шт.  | 1  |
|  | Комплект одноразовый (шапочка, бахилы, маска) | шт.  | 2  |
|  | Местный анестетик                             | амп. | 4  |
|  | Лейкопластырь                                 | см   | 30 |
|  | Шприц 5 мл                                    | шт.  | 2  |
|  | Нить хирургическая викрил                     | шт.  | 1  |
|  | Салфетки хирургические средние                | шт.  | 5  |
|  | Мазь «Левомиколь»                             | г    | 10 |
| 3.7. Иссечение современными техническими средствами анальных бахромок, или анальных трещин, или папиллом, или фибром, или кондилом | Перчатки                                      | пара | 1  |
|  | Мыло жидкое                                   | г    | 2  |
|  | Дезсредство                                   | мл   | 4  |
|  | Антисептик для рук                            | мл   | 3  |
|  | Комплект белья хирургический                  | шт.  | 1  |
|  | Комплект одноразовый (шапочка, бахилы, маска) | шт.  | 2  |
|  | Местный анестетик                             | амп. | 4  |
|  | Лейкопластырь                                 | см   | 30 |

|   |   |      |    |
|---|---|------|----|
|   | Шприц 5 мл                                    | шт.  | 2  |
|   | Нить хирургическая викрил                     | шт.  | 3  |
|   | Салфетки хирургические средние                | шт.  | 20 |
|   | Мазь «Левомиколь»                             | г    | 10 |
| 3.8. Геморроидэктомия с использованием аппарата Лигашу, или ультразвукового скальпеля, или сургитрона, или лазера | Перчатки                                      | пара | 1  |
|   | Мыло жидкое                                   | г    | 2  |
|   | Дезсредство                                   | мл   | 4  |
|   | Антисептик для рук                            | мл   | 3  |
|   | Комплект белья хирургический                  | шт.  | 1  |
|   | Комплект одноразовый (шапочка, бахилы, маска) | шт.  | 2  |
|   | Местный анестетик                             | амп. | 4  |
|   | Лейкопластырь                                 | см   | 30 |
|   | Шприц 5 мл                                    | шт.  | 2  |
|   | Нить хирургическая викрил                     | шт.  | 3  |
|   | Салфетки хирургические средние                | шт.  | 20 |
|   | Мазь «Левомиколь»                             | г    | 10 |
| 3.9. Вскрытие абсцедирующего эпителиального копчикового хода  | Перчатки                                      | пара | 1  |
|   | Мыло жидкое                                   | г    | 2  |
|   | Дезсредство                                   | мл   | 4  |
|   | Антисептик для рук                            | мл   | 3  |
|   | Комплект белья хирургический                  | шт.  | 1  |
|   | Комплект одноразовый (шапочка, бахилы, маска) | шт.  | 2  |
|   | Местный анестетик                             | амп. | 4  |
|   | Лейкопластырь                                 | см   | 30 |
|   | Шприц 5 мл                                    | шт.  | 2  |
|   | Нить хирургическая викрил                     | шт.  | 3  |
|   | Салфетки хирургические средние                | шт.  | 20 |
|   | Мазь «Левомиколь»                             | г    | 10 |
| 3.10. Дермоидоз промежности   | Перчатки                                      | пара | 1  |
|   | Мыло жидкое                                   | г    | 2  |
|   | Дезсредство                                   | мл   | 4  |
|   | Антисептик для рук                            | мл   | 3  |
|   | Комплект белья хирургический                  | шт.  | 1  |
|   | Комплект одноразовый (шапочка, бахилы, маска) | шт.  | 2  |
|   | Местный анестетик                             | амп. | 4  |
|   | Лейкопластырь                                 | см   | 30 |
|   | Шприц 5 мл                                    | шт.  | 2  |
|   | Нить хирургическая викрил                     | шт.  | 3  |
|   | Салфетки хирургические средние                | шт.  | 20 |



|   |  |          |      |
|---|--|----------|------|
|   | Мазь «Левомиколь»  | г        | 10   |
| 3.11. Иссечение параректальных кист           | Перчатки   | пара     | 1    |
|   | Мыло жидкое  | г        | 2    |
|   | Дезсредство  | мл       | 4    |
|   | Антисептик для рук   | мл       | 3    |
|   | Комплект белья хирургический                               | шт.      | 1    |
|   | Комплект одноразовый (шапочка, бахилы, маска)              | шт.      | 2    |
|   | Местный анестетик  | амп.     | 4    |
|   | Лейкопластырь  | см       | 30   |
|   | Шприц 5 мл   | шт.      | 2    |
|   | Нить хирургическая викрил                                  | шт.      | 3    |
|   | Салфетки хирургические средние                             | шт.      | 20   |
|   | Мазь «Левомиколь»  | г        | 10   |
|   | 3.12. Иссечение пресакральных кист                         | Перчатки | пара |
| Мыло жидкое                                   |  | г        | 2    |
| Дезсредство                                   |  | мл       | 4    |
| Антисептик для рук                            |  | мл       | 3    |
| Комплект белья хирургический                  |  | шт.      | 1    |
| Комплект одноразовый (шапочка, бахилы, маска) |  | шт.      | 2    |
| Местный анестетик                             |  | амп.     | 4    |
| Лейкопластырь                                 |  | см       | 30   |
| Шприц 5 мл                                    |  | шт.      | 2    |
| Нить хирургическая викрил                     |  | шт.      | 3    |
| Салфетки хирургические средние                |  | шт.      | 20   |
| Мазь «Левомиколь»                             |  | г        | 10   |
| 3.13. Иссечение анальной трещины              |  | Перчатки | пара |
|   | Мыло жидкое  | г        | 2    |
|   | Дезсредство  | мл       | 4    |
|   | Антисептик для рук   | мл       | 3    |
|   | Комплект белья хирургический                               | шт.      | 1    |
|   | Комплект одноразовый (шапочка, бахилы, маска)              | шт.      | 2    |
|   | Местный анестетик  | амп.     | 4    |
|   | Лейкопластырь  | см       | 30   |
|   | Шприц 5 мл   | шт.      | 2    |
|   | Нить хирургическая викрил                                  | шт.      | 3    |
|   | Салфетки хирургические средние                             | шт.      | 20   |
|   | Мазь «Левомиколь»  | г        | 10   |
|   | 3.14. Традиционное иссечение анального полипа или бахромок | Перчатки | пара |
| Мыло жидкое                                   |  | г        | 2    |

|   |   |      |    |
|---|---|------|----|
|   | Дезсредство                                   | мл   | 4  |
|   | Антисептик для рук                            | мл   | 3  |
|   | Комплект белья хирургический                  | шт.  | 1  |
|   | Комплект одноразовый (шапочка, бахилы, маска) | шт.  | 2  |
|   | Местный анестетик                             | амп. | 4  |
|   | Лейкопластырь                                 | см   | 30 |
|   | Шприц 5 мл                                    | шт.  | 2  |
|   | Нить хирургическая викрил                     | шт.  | 3  |
|   | Салфетки хирургические средние                | шт.  | 20 |
|   | Мазь «Левомиколь»                             | г    | 10 |
| 3.15. Геморроидэктомия с восстановлением слизистой анального канала | Перчатки                                      | пара | 1  |
|   | Мыло жидкое                                   | г    | 2  |
|   | Дезсредство                                   | мл   | 4  |
|   | Антисептик для рук                            | мл   | 3  |
|   | Комплект белья хирургический                  | шт.  | 1  |
|   | Комплект одноразовый (шапочка, бахилы, маска) | шт.  | 2  |
|   | Местный анестетик                             | амп. | 4  |
|   | Лейкопластырь                                 | см   | 30 |
|   | Шприц 5 мл                                    | шт.  | 2  |
|   | Нить хирургическая викрил                     | шт.  | 3  |
|   | Салфетки хирургические средние                | шт.  | 20 |
|   | Мазь «Левомиколь»                             | г    | 10 |
| 3.16. Иссечение эпителиального копчикового хода                     | Перчатки                                      | пара | 1  |
|   | Мыло жидкое                                   | г    | 2  |
|   | Дезсредство                                   | мл   | 4  |
|   | Антисептик для рук                            | мл   | 3  |
|   | Комплект белья хирургический                  | шт.  | 1  |
|   | Комплект одноразовый (шапочка, бахилы, маска) | шт.  | 2  |
|   | Местный анестетик                             | амп. | 4  |
|   | Лейкопластырь                                 | см   | 50 |
|   | Шприц 5 мл                                    | шт.  | 2  |
|   | Нить хирургическая викрил                     | шт.  | 3  |
|   | Салфетки хирургические средние                | шт.  | 20 |
|   | Мазь «Левомиколь»                             | г    | 10 |
| 3.17. Традиционное иссечение периаанальных кандилом                 | Перчатки                                      | пара | 1  |
|   | Мыло жидкое                                   | г    | 2  |
|   | Дезсредство                                   | мл   | 4  |
|   | Антисептик для рук                            | мл   | 3  |
|   | Комплект белья хирургический                  | шт.  | 1  |

|  |      |    |
|--|------|----|
| Комплект одноразовый (шапочка,<br>бахилы, маска) | шт.  | 2  |
| Местный анестетик                                | амп. | 4  |
| Лейкопластырь                                    | см   | 50 |
| Шприц 5 мл                                       | шт.  | 2  |
| Нить хирургическая викрил                        | шт.  | 2  |
| Салфетки хирургические средние                   | шт.  | 10 |

---