

Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 5 декабря 2022 г. № 113

На основании абзаца девятого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-ХП «О здравоохранении», подпункта 8.3 пункта 8, подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в клинический протокол «Диагностика и лечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 5 декабря 2022 г. № 113, следующие изменения:

в пункте 35:

в части третьей подпункта 35.7:

абзацы тридцатый и тридцать первый изложить в следующей редакции:

«локальная химиотерапия:

суперселективная интраартериальная химиотерапия (далее – СИАХТ) проводится путем катетеризации глазничной артерии в условиях медикаментозного сна с последующим введением противоопухолевых ЛС. Перед, во время и после СИАХТ проводится контроль диаметра и скорости кровотока в глазничной артерии с использованием УЗИ с доплерографией. При СИАХТ используется мелфалан, лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения 50 мг (5–7,5 мг/м²) для каждого пораженного глаза со степенью распространения опухоли, соответствующей группам С или D (доза мелфалана, лиофилизата для приготовления раствора для внутрисосудистого введения 5 мг/м² используется при двусторонней РБ, доза 7,5 мг/м² – при односторонней РБ). При удовлетворительном состоянии глазничной артерии и положительном эффекте возможно проведение 3-х и более курсов СИАХТ с интервалом 21 день;»;

дополнить часть абзацем следующего содержания:

«интравитреальные инъекции в проекции плоской части цилиарного тела проводят с применением мелфалана в дозе 20–30 мкг в 0,1–0,15 мл 0,9 % натрия хлорида (раствора для инъекций (инфузий) 9 мг/мл);»;

в части первой подпункта 35.8:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«при неэффективности мелфалана при СИАХТ, рецидиве РБ применяются комбинации ЛС: мелфалан+топотекан*, мелфалан+топотекан*+карбоплатин. Дозы ЛС в зависимости от возраста пациента: детям в возрасте от 6 месяцев до 1 года – мелфалан 3 мг, топотекан* 0,3 мг, карбоплатин 30 мг, 1–3 года – мелфалан 4 мг, топотекан* 0,3 мг, карбоплатин 32 мг, детям в возрасте старше 3-х лет – мелфалан 5 мг, топотекан* 0,4 мг, карбоплатин 33 мг. Каждое из ЛС разводится в 10 мл 0,9 % натрия хлорида (раствора для инъекций (инфузий) 9 мг/мл) и вводится внутриартериально путем инфузии со скоростью 0,7–1,0 мл/мин;»;

после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:

«при резистентных витреальных отсевах интравитреальные инъекции проводят с применением топотекана* в дозе от 30 до 90 мкг в 0,15 мл 0,9 % натрия хлорида (раствора для инъекций (инфузий) 9 мг/мл). Также используются комбинации топотекана* 30 мкг с мелфаланом 30 мкг в 0,15 мл 0,9 % натрия хлорида (раствора для инъекций (инфузий) 9 мг/мл)». Интравитреальные инъекции можно повторять каждые 10–14 дней. Длительность терапии зависит от ответа на лечение;».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

СОГЛАСОВАНО

Брестский областной
исполнительный комитет

Витебский областной
исполнительный комитет

Гомельский областной
исполнительный комитет

Гродненский областной
исполнительный комитет

Минский областной
исполнительный комитет

Минский городской
исполнительный комитет

Могилевский областной
исполнительный комитет

Государственный пограничный
комитет Республики Беларусь

Комитет государственной
безопасности Республики Беларусь

Министерство внутренних дел
Республики Беларусь

Министерство обороны
Республики Беларусь

Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь

Национальная академия наук Беларуси

Управление делами
Президента Республики Беларусь